


# TANG GOLD (TANGO)

Mutación obtenida en California a partir de la irradiación de yemas de la variedad Afourer-W.Murcott. El árbol es vigoroso, de porte erecto y con alguna espina pequeña. La viabilidad del polen es muy baja. La variedad es partenocárpica y autoincompatible.

Variedad sin semillas, con tamaño de árbol y fruto ligeramente inferior a Nadorcott. Al igual que esta, tiene tendencia a la defoliación, especialmente si se injerta sobre Citrange. Es sensible al bufado y si se retrasa mucho la recolección la corteza del fruto se decolora.



EVOLUCION DE LA MADUREZ DEL FRUTO



Características fruto

<b>Peso g</b>	70 - 90
<b>Diámetro mm</b>	50 - 60
<b>Forma</b>	Oblata <span style="float: right;">Diámetro / altura = 1,31</span>
<b>Corteza mm</b>	2,3 - 2,8
<b>Color</b>	Naranja intenso <span style="float: right;">índice color = 21</span>
<b>Dificultad pelado</b>	Fácil
<b>% zumo</b>	50 - 54
<b>Semillas</b>	No.
<b>Fructificación</b>	Alta, mejora con tratamiento para el cuajado
<b>Recolección</b>	20 diciembre - 5 marzo