

‘JAVIERÍN’

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 45% y el 25,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad poco productiva.

Hojas de gran tamaño, con densidad de dientes media. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (2 días después que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración abundante (media de 187 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,58%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (7 días después que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Color de la piel amarillo anaranjado y pulpa de color naranja.

Peso medio de 75,90 g, calibre medio de 51,25 mm y espesor de la pulpa de 12,26 mm. Pelado un poco difícil y de buen sabor.

Sólidos solubles: 13,50 °Brix.

Acidez: 7,02 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,10 Kg/ cm².

Semillas de forma ovalada, peso medio de 3,46 g y una media de 2-3 semillas por fruto.

