

## 'M. AIXARÀ'

### 1. *Características vegetativas*

Variedad muy vigorosa, porte abierto y una media de 3 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 15% y el 8% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad poco productiva.

### 2. *Floración*

Plena floración en la primera semana de noviembre (5 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración medianamente abundante (media de 165 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 10,10 %.

### 3. *Características del fruto*

Plena maduración en la segunda semana de mayo (6 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 70,36 g, calibre medio de 49,27 mm y espesor de la pulpa de 9,76 mm. Pelado un poco difícil y de buen sabor.

Sólidos solubles: 13,50 °Brix.

Acidez: 10,05 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,64 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,93 g y una media de 3 semillas por fruto.

