

'SAN FILIPPARO'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte erecto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 73,5% y el 41% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad poco productiva.

Hojas grandes, con los dientes espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de diciembre (32 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 275 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,36%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de mayo (19 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 52,03 g, calibre medio de 38,93 mm y espesor de la pulpa de 9,92 mm. Pelado fácil y de sabor bastante malo. Le afecta de forma considerable la mancha púrpura y tiende a rajarse ligeramente.

Sólidos solubles: 11,3 °Brix

Acidez: 17,24 g/l ác. málico

Firmeza: 1,04 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,31 g y una media de 2-3 semillas por fruto.

