

## ‘SAVAL MORENO’

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte erecto y una media de 2 brotes laterales por brote central. Aproximadamente el 57,5% y el 61,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad productiva.

Hojas grandes, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal plana.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (4 días antes que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 243 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 2,86%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (2 días antes que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 42,26 g, calibre medio de 40,19 mm y espesor medio de la pulpa de 9,41 mm. Pelado fácil y de sabor aceptable.

Sólidos solubles: 10,25 °Brix.

Acidez: 10,11 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,85 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,66 g y una media de 4 semillas por fruto.

