

## 'SAVAL TEMPRANO'

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte semi abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 91,5% y el 43,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad poco productiva.

Hojas grandes, con los dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (4 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 174 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 5,64%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (6 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice convexo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 50,80 g, calibre medio de 41,25 mm y espesor de la pulpa de 9,10 mm. Pelado fácil y de sabor aceptable.

Sólidos solubles: 11,40 °Brix.

Acidez: 11,35 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,30 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,88 g y una media de 3 semillas por fruto.

