

'BIANCO'

1. *Características vegetativas*

Variedad poco vigorosa, porte erecto y una media de 3 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 38,5% y el 6,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad muy poco productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

2. *Floración*

Plena floración en la cuarta semana de noviembre (13 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 178 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,60 %.

3. *Características del fruto*

Plena maduración en la segunda semana de mayo (7 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Piel de color amarillo y carne blanca.

Peso medio de 45,01 g, calibre medio de 42,38 mm y espesor de la pulpa de 9,59 mm. Pelado fácil y de sabor mediocre. Tiene mucha tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 12,8 °Brix.

Acidez: 10,60 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,05 Kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,71 g y una media de 2-3 semillas por fruto.

