

'COX'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y una media de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 40,3% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes densos. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (10 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración medianamente abundante (media de 173 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 8,68%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (6 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz cerrada y ápice plano. Piel de color amarillo y pulpa de color blanca-amarillenta.

Peso medio de 41,67 g, calibre medio de 39,09 mm y espesor de la pulpa de 7,83 mm. Pelado fácil y sabor aceptable a bueno. Nula incidencia de mancha púrpura, rajado y moteado.

Sólidos solubles: 10,82 °Brix.

Acidez: 7,61 g/l ác. málico

Firmeza: 0,99 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,43 g y una media de 5 semillas por fruto.

