

'TANAKA'

1. *Características vegetativas*

Variedad de vigor medio, porte erecto y una media de 3 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 83% y el 15,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad productiva.

Hojas de tamaño medio, con densidad de dientes media. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva.

2. *Floración*

Plena floración en la tercera semana de noviembre (11 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración medianamente abundante (media de 167 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 8,14%.

3. *Características del fruto*

Plena maduración en la tercera semana de mayo (13 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Color de la piel y de la pulpa amarillo anaranjado.

Peso medio de 60,62 g, calibre medio de 48,51 mm y espesor de la pulpa de 8,85 mm. Pelado fácil y de muy buen sabor.

Sólidos solubles: 10,90 °Brix.

Acidez: 8,26 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,34 Kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,60 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

