

## 'ESTRADA GROC'

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte semi abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 80% de los brotes laterales también lo son. Variedad productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes densos. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (11 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 232 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,89%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (11 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal redonda, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 38,97 g, calibre medio de 38,26 mm y espesor de la pulpa de 8,52 mm. Pelado fácil y sabor aceptable. Nula incidencia de mancha púrpura, rajado y moteado.

Sólidos solubles: 10,77 °Brix.

Acidez: 16,35 g/l ác. málico

Firmeza: 0,87 Kg/cm<sup>2</sup>

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,90 g y una media de 3 semillas por fruto.

