

‘MATA MOUROS REGIONAL’

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una mayoría de 2 brotes laterales por brote central.

El 75% de los brotes centrales son fructíferos y un 50% de los brotes laterales también lo son. Variedad bastante productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la cuarta semana de noviembre (18 días después que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración abundante (media de 209 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 7,90%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la tercera semana de mayo (16 días después que ‘Algerie’).

Fruto ovalado alargado, sección transversal redondeada, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente cerrada y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 61,50 g, calibre medio de 41,75 mm y espesor de la pulpa de 9,54 mm. Pelado fácil y sabor medio. Muy poco sensible a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 12,00 °Brix.

Acidez: 5,61 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,79 kg/cm².

Semillas de forma elíptica y redondeada, peso medio de 2,25 g y una media de 2 semillas por fruto. Tegumento jaspeado.

