

'TAVIRA'

1. Características vegetativas

Variedad poco vigorosa, porte abierto y con una mayoría de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal plana y curva.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (igual que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración abundante (media de 196 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 8,58%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (3 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz entre abierta y cerrada, ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 73,65 g, calibre medio de 49,00 mm y espesor de la pulpa de 12,12 mm. Pelado fácil y sabor medio tirando a mediocre. Muy ligera tendencia a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 9,60 °Brix.

Acidez: 13,68 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,80 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,50 g y una media de 3 semillas por fruto. Tegumento jaspeado.

