

## ‘TEMPRANO DE PETRÉS’

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 50% de los brotes centrales son fructíferos y un 30% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy poco productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (10 días antes que ‘Algerie’).

Panícula cónica-intermedia de floración abundante (media de 184 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 11,25%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (3 días antes que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular a angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 61,92 g, calibre medio de 47,4 mm. y espesor de la pulpa de 9,21 mm. Pelado medio y sabor mediocre. Escasa incidencia de mancha rajado y moteado y ligera incidencia de mancha púrpura.

Sólidos solubles: 11,25 °Brix.

Acidez: 12,96 g/l ác. málico

Firmeza: 1,15 Kg/cm<sup>2</sup>

Semillas de forma elíptica-redondeadas, peso medio de 2,43 g y una media de 4 semillas por fruto.

