

'NADAL TEMPRANO'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 56% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes densos. Forma del ápice entre aguda e intermedia, sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (8 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 253 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,75%.

3. Características del fruto

Plena floración en la cuarta semana de abril (12 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal redonda, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 37,09 g, calibre medio de 39,08 mm y espesor de la pulpa de 8,15 mm. Pelado fácil y sabor muy bueno. Nula incidencia de mancha púrpura y moteado y escasa incidencia de rajado.

Sólidos solubles: 12,30 °Brix.

Acidez: 11,27 g/l ác. málico

Firmeza: 1,13 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,10 g y una media de 3 semillas por fruto.

