

## 'RONDA GRUESOS'

### 1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, porte abierto y entre 1 y 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 45% de los brotes centrales son fructíferos y un 16% de los laterales también lo son. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño especialmente muy grande, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal plana y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (5 días después que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración poco abundante (media de 138 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 3,08%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (8 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta o cerrada, ápice cóncavo. La piel es de color amarilla y la pulpa anaranjada.

Peso medio de 156,18 g, calibre medio de 64,80 mm y espesor de la pulpa de 15,17 mm. Pelado difícil y sabor aceptable. Poco sensible a la mancha púrpura, medianamente sensible al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 9,55 °Brix.

Acidez: 7,05 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,88 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma ovalada y redondeada, peso medio de 5,17 g y una media de entre 2 y 3 semillas por fruto.

