

'MASÍA LA CAÑERA'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una mayoría de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (1 día después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 253 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,34%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la tercera semana de mayo (13 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color naranja.

Peso medio de 63,30 g, calibre medio de 48,10 mm y espesor de la pulpa de 11,12 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Bastante sensible a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,80 °Brix.

Acidez: 10,36 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,70 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 4,28 g y una media de 3 semillas por fruto.

