

'REQUINA'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 95% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (1 día después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 224 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,23%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal redondeada, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 82,61 g, calibre medio de 49,81 mm y espesor de la pulpa de 12,07 mm. Pelado fácil y de muy buen sabor. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,15 °Brix.

Acidez: 5,70 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,36 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,38 g y una media de 3 semillas por fruto.

