

'WANZHONG'

1. Características vegetativas

Variedad poco vigorosa, porte abierto y con una media de 1 brote lateral por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos, no siéndolo ninguno de los laterales. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño grande con el borde liso. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva y plana.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (2 días antes que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración poco abundante (media de 139 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,12%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (5 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. La piel es de color anaranjado y la pulpa amarillenta.

Peso medio de 62,70 g, calibre medio de 48,25 mm y espesor de la pulpa de 11,60 mm. Pelado difícil y de buen sabor. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura, nula tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 9,60 °Brix.

Acidez: 14,86 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,74 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,57 g y una media de 3 semillas por fruto.

