

'DAZHONG'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 1 brote lateral por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 15% de los brotes laterales también lo son. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes poco espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal curva y plana.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (3 días después que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración abundante (media de 209,5 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 3,40%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (5 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 84,56 g, calibre medio de 50,82 mm y espesor de la pulpa de 10,80 mm. Pelado difícil y de sabor de medio a bajo. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura, nula tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 9,60 °Brix.

Acidez: 9,49 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,97 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,42 g y una media de 4 semillas por fruto.

