

## 'ZAOZHONG - 6'

### 1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

### 2. Floración

Plena floración en la tercera semana de octubre (18 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 265,5 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 4,60%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de abril (21 días antes que 'Algerie').

Fruto elíptico, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz cerrada y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 52,84 g, calibre medio de 40,81 mm y espesor de la pulpa de 9,62 mm. Pelado difícil y de buen sabor. Muy sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 13,05 °Brix.

Acidez: 9,90 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,78 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,00 g y una media de 4 semillas por fruto.

