

'FRANCISCO EL GORDO'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 70% de los laterales son fructíferos. Variedad de producción media.

Hojas de tamaño grande con dientes espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal plana.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (2 días después que 'Algerie').

Panícula de forma intermedia, de floración media (media de 239 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 7%.

3. Características del fruto

Maduración en la primera semana de mayo (1 día después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 61 g, calibre medio de 45,24 mm y espesor de la pulpa de 10,21 mm. Pelado con ligera dificultad y de sabor aceptable. Nula incidencia de mancha púrpura, mediana tendencia al rajado y elevada sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 11,30 °Brix.

Acidez: 6,38 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,40 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,33 g y una media de 4 semillas por fruto.

