

## 'LLINARES'

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la tercera semana de octubre (18 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma intermedia, de floración baja (media de 143 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 10,14%.

### 3. Características del fruto

Maduración en la tercera semana de abril (13 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta, y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 53 g, calibre medio de 43,13 mm y espesor de la pulpa de 9,75 mm. Pelado fácil y de sabor bueno. Ligera incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y ligera sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 13,63 °Brix.

Acidez: 16,46 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,35 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,80 g y una media de 3 semillas por fruto.

