

## 'AMANKAKI'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte colgante y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 28 de marzo (+6 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,80 cm y 9,08 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,61).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 21,54 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 12 de noviembre (+14 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 15 de enero (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 202,44 g, calibre medio 73,67 mm, relación longitud / anchura 0,90.

Fruto redondeado, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, y débil agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 20,15 °Brix

Acidez: 2,46 g/l ác. málico

Firmeza: 3,34 kgf

