

'AIZUMISHIRAZU-A'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 25 de marzo (+3 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base obtusa y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 14,08 cm y 9,16 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,54).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 14,10 mm, generalmente con cuatro lóbulos, aunque también presentan flores con más de cuatro, y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 18 de octubre (-11 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 3 de enero (-1 día respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 148,90 g, calibre medio 66,01 mm, relación longitud / anchura 0,88.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,00 °Brix

Acidez: 2,31 g/l ác. málico

Firmeza: 3,44 kgf

