

## 'KAKI TIPO'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 24 de marzo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base obtusa y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,95 cm y 9,90 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,63).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 2 de mayo (-3 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 22,73 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de noviembre (+7 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 8 de enero (+4 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 311,58 g, calibre medio 87,70 mm, relación longitud / anchura 0,84.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, y moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto y horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,90 °Brix

Acidez: 1,81 g/l ác. málico

Firmeza: 3,51 kgf

