

## 'TOMATERO'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 25 de marzo (+3 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 17,42 cm y 8,12 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,16).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 5 de mayo (igual que 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 16,46 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 4 de octubre (-25 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 23 de noviembre (-42 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 129,09 g, calibre medio 62,68 mm, relación longitud / anchura 0,87.

Fruto oblongo ancho transversal, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,95 °Brix

Acidez: 2,00 g/l ác. málico

Firmeza: 3,03 kgf

