

'HIRATANENASHI'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 15 de marzo (-7 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base redondeada y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 16,24 cm y 9,73 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,68).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 30 de abril (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 20,64 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 22 de octubre (-7 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 10 de diciembre (-25 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 159,17 g, calibre medio 71,01 mm, relación longitud / anchura 0,62.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 20,68 °Brix

Acidez: 1,85 g/l ác. málico

Firmeza: 3,00 kgf

