

'ICHIKIKEI JIRO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 1 de abril (+9 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base obtusa ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 13,61 cm y 9,37 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,45).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,44 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica y cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 24 de octubre (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 7 de enero (+3 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 201,73 g, calibre medio 78,07 mm, relación longitud / anchura 0,64.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal superficial.

El cáliz está al mismo nivel que el fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 17,97 °Brix

Acidez: 0,58 g/l ác. málico

Firmeza: 6,88 kgf

