

## 'KODA GOSHO'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto, con flores femeninas y, dependiendo del año, también puede presentar flores masculinas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 29 de marzo (+7 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base redondeada con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 12,87 cm y 9,60 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,34).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 28 de abril (-7 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,04 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 8 de noviembre (+9 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 28 de enero (+24 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 164,73 g, calibre medio 73,65 mm, relación longitud / anchura 0,70.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado, moderado acanalado del mismo, y sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 16,72 °Brix

Acidez: 0,97 g/l ác. málico

Firmeza: 6,16 kgf

