

'AKUOMANKAKI'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 7 de abril (+15 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 11,61 cm y 7,72 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,50).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 15,33 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 2 de diciembre (+33 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 23 de enero (+19 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 313,24 g, calibre medio 86,88mm, relación longitud / anchura 0,88.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja amarillento y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 19,77 °Brix

Acidez: 1,21 g/l ác. málico

Firmeza: 4,24 kgf

