

## 'RAMA FORTE'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 30 de marzo (+8 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda estrecha con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 12,34 cm y 7,72 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,60).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 1 de mayo (-4 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,51 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 25 de octubre (-24 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de enero (+14 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 123,79 g, calibre medio 66,40 mm, relación longitud / anchura 0,66.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Ausencia de agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y la pulpa es naranja.

Sólidos solubles: 19,38 °Brix

Acidez: 0,95 g/l ác. málico

Firmeza: 6,80 kgf

