

## 'GIBOSHI'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto, con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 6 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,06 cm y 6,98 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,73).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 5 de mayo (igual que 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 9,30 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 10 de octubre (-19 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 2 de diciembre (-32 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 109,94 g, calibre medio 59,94 mm, relación longitud / anchura 0,94.

Fruto oval ancho, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, sin acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es rojo anaranjado y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 16,98 °Brix

Acidez: 0,90 g/l ác. málico

Firmeza: 4,45 kgf

